

Reflusso gastroesofageo


peculiarità dell'età pediatrica



# RGE - definizione

- il reflusso gastroesofageo è il ritorno di contenuto gastrico in esofago attraverso la giunzione gastroesofagea
- il rge si definisce funzionale (sintomatico) quando si manifesta in un lattante con rigurgiti post-prandiali (sia pure frequenti) senza interessamento della crescita e dello stato di salute
- la malattia da rge e' la condizione in cui il reflusso determina segni e sintomi di malattia, dovuti prevalentemente all'infiammazione della mucosa esofagea o a complicanze extraintestinali (ad es. respiratorie)

# COMPONENTI PATOGENETICHE DELLA MALATTIA DA RGE



# GER FUNZIONALE in età infantile: caratteristiche

- rigurgito quotidiano >> vomito
- Ottimo stato di salute ("*happy spitting out*")
- Normale pattern di crescita
- Discomfort dei genitori
- Frequenti cambi di formule
- Nessuna efficacia dei farmaci
- Generalmente si risolve tra i 12-18 mesi di età

Può trasformarsi in malattia da RGE in ogni momento !



VS



## Reflusso funzionale (RGE)

- rigurgito >> vomito, quotidiano
- Ottimo stato di salute (*"happy spitting out"*)
- Normale pattern di crescita
- Generalmente si risolve tra i 12-18 mesi di età

## Malattia da Reflusso Gastroesofageo (MRGE)

Presenza di segni e sintomi di malattia dovuti all' infiammazione della mucosa esofagea

- Dolore
- Rifiuto alimentazione
- Scarsa crescita
- Complicanze extraintestinali (ad es. respiratorie)


# Malattia da reflusso gastroesofageo - sintomi

## Manifestazioni tipiche

- Pirosi
- Rigurgito
- (Vomito)



Passaggio di contenuto gastrico in faringe e in bocca accompagnato da emissione di materiale liquido dalla bocca



Espulsione forzata di contenuto gastrico dalla bocca

# Manifestazioni atipiche

- Respiratorie

- Asma/ wheezing
- Tosse
- Broncopolmoniti /bronchiti ricorrenti
- ALTE (apparent life-threatening events)
- laringite e altre manifestazioni ORL

- Neurocomportamentali

- Irritabilità
- Sindrome di Sandifer

Dystonic Head Posturing =  
atteggiamento posturale distonico  
con flessione laterale e  
intermittente del collo e/o  
atteggiamento in opistotono con  
inarcamento del tronco


# Malattia da RGE - sintomi

	LATTANTE	BAMBINO
Vomito	Comune	Possibile
Rigurgito	Molto Comune	Comune
Pirosi	?	Comune
Disfagia	?	Possibile
Dolore toracico	?	Possibile
Pianto/irritabilità	Molto Comune	Possibile
Scarsa crescita	Comune	Possibile
Rifiuto del cibo/anoressia	Comune	Possibile
Anemia/melena/emate mesi	Possibile	Possibile



	LATTANTE	BAMBINO
Sdr. Sandifer	Comune	Possibile
Erosioni dentali/alitosi	Assenti	Possibile
Tosse persistente/polmoniti ricorrenti/wheezing/ asma	Possibile	Possibile
Laringiti	Possibile	Possibile
Laringomalacia/croup/ stridore	Possibile	Possibile
ALTE	Possibile	Assente
Disturbi del sonno	Possibile	Possibile
Esofagite	Possibile	Possibile
Stenosi esofagea	Assente	Rara

# Diagnosi differenziale



# Diagnosi differenziale - Cause di vomito nel bambino

- Ostruzioni gastrointestinali

- Stenosi ipertrofica del piloro
- Malrotazione con volvolo intermittente
- Duplicazione Intestinale
- Malattia di Hirschsprung
- Anello duodenale
- Corpi estranei
- Ernia incarcerata

- Altre Patologie gastrointestinali

- Acalasia
- Gastroparesi
- Gastroenterite
- Ulcera Peptica
- Esofagite eosinofila
- Food allergy
- Malattie infiammatorie intestinali croniche
- Pancreatite
- Appendicite

- Infezioni

- Sepsi
- Meningiti
- Infezioni vie urinarie
- Polmoniti
- Otite media
- Epatite

- Metaboliche/endocrine

- Galattosemia
- Intolleranza ereditaria al fruttosio
- Difetti del ciclo dell'urea
- Amino and organic acidemias
- Iperplasia surrenalica congenita
- Munchausen syndrome by proxy
- Maltrattamento/abuso
- Self-induced vomiting
- Sindrome del vomito ciclico

- Neurologiche

- Idrocefalo
- Ematoma subdurale
- Emorragia Intracranica
- Massa Cerebrale
- emicrania
- malformazione di Chiari

- Renali

- Uropatia ostruttica
- Insufficienza renale

- Tossiche

- Piombo
- Ferro
- Vitamine A e D
- Farmaci (ipecacuana, digossina, theofillina, etc)

- Cardiache

- Insufficienza cardiaca
- Anelli vascolari

# Anamnesi

## Anamnesi alimentare

- Quantità/frequenza (overfeeding)
- Preparazione della formula
- Recenti variazioni di formula o tipologia di somministrazione
- Posizione durante allattamento
- Eruttazioni/singhiozzo
- Comportamento durante l'allattamento (Soffocamento, conati di vomito, tosse, inarcamento, disagio, rifiuto)

## Pattern vomito

- Frequenza/quantità
- dolore
- Vomito ematico o biliare
- Associazione con febbre, letargia, diarrea

## Storia familiare psicosociale

- Stress, depressione Postpartum
- Abuso di farmaci (madre o padre)

## Anamnesi familiare

- Patologie di rilievo
- Familiarità per patologie gastrointestinali/ atopia

## Storia medica

- Prematurità
- Crescita e sviluppo
- Pregressa chirurgia, ospedalizzazione
- Screening neonatale
- Malattie ricorrenti croup, polmoniti, asma
- Apnea
- Raucedine, singhiozzo

## Crescita ponderale e staturale nei mesi precedenti

- Altre malattie croniche
- Farmaci
- Segnali di allarme

# RED flags RGE

- Perdita di peso, rifiuto del cibo
- Disfagia, dolore toracico
- Aumento intensità e frequenza del vomito
- Asma, infezioni respiratorie ricorrenti, wheezing
- Ematemesi
- Vomito biliare
- Apnea, cianosi, ALTE

# PAZIENTI A RISCHIO DI MALATTIA DA REFLUSSO SEVERA

- Patologie neurologiche
- Obesità
- Atresia esofagea operata o altre anomalie congenite dell'esofago
- Malattie respiratorie croniche/trapianto polmonare
- Neonato prematuro



Nei lattanti e nei bambini più piccoli non ci sono sintomi o un complesso di sintomi che siano diagnostici di GERD o che possano predire la risposta alla terapia.

Nei bambini più grandi e negli adolescenti come nei pazienti adulti, l'anamnesi e l'obiettività clinica possono essere sufficienti per la diagnosi di GERD in presenza di sintomi tipici.

# Diagnosi

- pHmetria esofagea/ pHimpedenzometria esofagea
- Endoscopia con biopsie
- Rx I vie con contrasto?
- PPI empiric trial?

# Indicazioni alla pH-impedenzometria



- Pazienti con sintomatologia atipica
  - Tosse
  - Asma
  - Laringite
  - Raucedine
- Pazienti con sintomi in terapia (PPI)
  - Circa il 12% dei pazienti non rispondono alla terapia con PPI

# Parametri refertazione pHimpedenzo-metria

## 1. Tipo di reflussi

- acidi
- non-acidi
- debolmente acidi

## 2. Caratteristiche del reflusso

- liquido
- gas
- misto

## 3. Numero e % di tempo degli episodi di reflussi

## 4. Estensione prossimale degli episodi di reflusso


## 5. Tempo di clearance del bolo

## 6. Correlazione sintomi

# Monitoraggio MII-pH vs pH-metria

[illegible]

# Diagnosi

- plimetria esofagea/ plimpedenzometria esofagea
- Endoscopia con biopsie  Diagnosi differenziale:
  - Esofagite eosinofila
  - Dispepsia Funzionale
- Rx I vie con contrasto?
- PPI empiric trial?


# Diagnosi

- pHmetria esofagea/ pHimpedenzometria esofagea
- Endoscopia con biopsie
- Rx I vie con contrasto
  - non per la diagnosi ma per escludere anomalie tratto digerente superiore che possano dare sintomi che mimano GERD
- PPI empiric trial?


# Diagnosi

- pHmetria esofagea/ pHimpedenzometria esofagea
- Endoscopia con biopsie
- Rx I vie con contrasto?

- PPI empiric trial?



No in lattante e bambino in età prescolare



Possibile se sintomi tipici senza segni di allarme in bambino di età > 8 anni



# Trattamento - lattante

- RGE funzionale:

Modifiche dello stile di vita:

- Nutrizione
- Posizione
- Rassicurare i genitori

# Latti inspessiti/antirigurgito

I latti "antireflusso" sono latti inspessiti con


- amido di riso
- amido di
- farin
- amilop

Nessun effetto su  
numero di episodi di reflusso  
all'ora  
né sul numero di episodi di  
reflusso lunghi  
(> 5 minuti)

L'inspessimento ne aumenta la densità calorica,  
quindi l'osmolarità quindi riduce la percentuale  
di rigurgito e vomito e favorisce l'incremento  
ponderale

# Ispezziamo il latte?

- Effetto "cosmetico"
- Minori rigurgiti ma identico indice di reflusso
- Aumento quota calorica



# Trattamento -

## Malattia da RGE

### - lattante



- Indicazioni comportamentali
- Anti H<sub>2</sub>/(PPI off label)
- Antiacidi?
- Procinetici?


### - bambino

- Indicazioni comportamentali e alimentari
- PPI/antiH<sub>2</sub>


## RGE non complicato


Pediatric Gastroesophageal Reflux Clinical  
Practice Guidelines:  
Joint Recommendations of the North  
American Society for  
Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and  
Nutrition  
(NASPGHAN) and the European Society for  
Pediatric  
Gastroenterology, Hepatology, and  
Nutrition (ESPGHAN)





Lattante con  
rigurgito e  
scarsa  
crescita





Bambino > 8  
anni con piroso





# Malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI)

## Peculiarità dell'età pediatrica

# Malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) dell'età pediatrica

- colite ulcerosa (CU)
- malattia di Crohn (MC)
- colite indeterminata (CI)

# SPECTRUM OF INFLAMMATORY BOWEL DISEASE IN CHILDHOOD

coinvolge in maniera segmentale e trasmurale qualsiasi tratto dell'intestino potendo localizzarsi in più sedi anche se la localizzazione più frequente è quella ileo-colica.

Si individuano tre varianti clinico-patologiche della malattia distinguibili in

- infiammatoria
- Stenosante
- fistolizzante

**CROHN'S DISEASE**

**ULCERATIVE COLITIS**

interessa solo la mucosa del colon; l'infiammazione è continua e si estende dal retto a porzioni più prossimali del viscere


**INDETERMINATE COLITIS**

costituisce il 10-15% delle MICI; l'infiammazione è confinata al colon e ha caratteristiche endoscopiche e istologiche che non permettono una chiara distinzione tra MC e CU

# Eziopatogenesi


- Agenti infettivi?
- Alterazioni della produzione del muco e della permeabilità intestinale?
- Alterazioni del microcircolo intestinale?
- Alterazioni della risposta immune e della produzione degli auto-anticorpi

changing pattern of pediatric inflammatory bowel disease in  
northern stockholm, 1990-2001. *gut*, 2003;52:1432-4



# CHILDREN WITH EARLY-ONSET IBD

Heyman MB et al - J Pediatr 2005;146: 35-40



# Fattori epidemiologici

- > picco d'incidenza II e III decade della vita
- > incidenza nel Nord America e nel Nord Europa
- > incidenza nei popoli che migrano (componente genetica si unisce a quella ambientale!)
- > rischio di malattia negli ebrei Ashkenazi
  - incidenza > 2-4 volte
  - prevalenza > 2-9 volte



# Fattori familiari

- 10-30% dei pazienti ha un parente affetto
- Nello stesso gruppo familiare vi è una concordanza del 70-80% per il tipo di malattia
- Esiste una concordanza nell'ambito familiare per la localizzazione della malattia, la presenza di manifestazioni extraintestinali e il decorso clinico
- L'età alla diagnosi di malattia nella 2° generazione risulta essere anticipata

# Quando sospettare una MICI?


Una MICI deve essere sospettata in presenza di:

- ◆ sintomi intestinali;
- ◆ sintomi o malattie extraintestinali;
- ◆ malattia perineale

Tali manifestazioni possono essere presenti all'esordio singolarmente o in varie combinazioni tra loro; è quindi possibile che la presentazione clinica delle MICI avvenga esclusivamente con sintomi extraintestinali

# Sintomi intestinali

- Diarrea muco-ematica
- Quadro di Malassorbimento
- Quadro subocclusivo
- Dispepsia



Rallentamento o  
ritardo di crescita

# malattia perianale

Ad appannaggio quasi esclusivo della MC, consiste in ragadi non dolorose, profonde ulcerazioni perianali, fistole, ascessi, tags o maresche (escrescenze carnose).

Non rara (20-25%)

# SINTOMI O MALATTIE EXTRAINTESTINALI

Possono accompagnarsi a sintomi intestinali o precederli di mesi o anni, costituendo l'esclusiva presentazione clinica della malattia.

- ◆ *Sistemici*: anoressia, astenia, calo ponderale, febbre, ippocratismo digitale.
- ◆ *Auxologici*: ritardo di crescita staturo-ponderale, ritardo puberale.

*Oculistici:* episclerite, uveite.

*Cutaneo-mucosi:* aftosi orale ricorrente, eritema nodoso, pioderma gangrenoso.

*Reumatologici:* artropatia (solo dolore), artrite (segni infiammatori grandi e piccole articolazioni), sacroileite, spondilite anchilosante.

*Epatologici:* ipertransaminasemia orfana, cirrosi, colangite sclerosante (frequentemente associata alla CU).

# sintomi

## RCU

- Rettorragia 95%
- Diarrea 95%
- Dolore addominale 75%
- Calo ponderale 50%
- Febbre 30%
- Ritardo di crescita 10%
- Extra-intestinale 5%

## CROHN

- Dolore addominale 85%
- Diarrea 80%
- Calo ponderale 80%
- Ritardo di crescita 25-85%
- Febbre 35-70%
- Anoressia 30-70%
- Rettorragia 35%
- Malattia perianale 25%
- Extra-intestinale 25%
- Nausea e vomito 20%

# sintomi

## RCU

- **Rettorragia 95%**
- Diarrea 95%
- Dolore addominale 75%
- Calo ponderale 50%
- Febbre 30%
- Ritardo di crescita 10%
- Extra-intestinale 5%

## CROHN

- Dolore addominale 85%
- Diarrea 80%
- Calo ponderale 80%
- Ritardo di crescita 25-85%
- Febbre 35-70%
- Anoressia 30-70%
- **Rettorragia 35%**
- Malattia perianale 25%
- Extra-intestinale 25%
- Nausea e vomito 20%



# Diagnosi differenziale

## Cause di sanguinamento rettale

Neonato	Lattante	Età prescolare	Età scolare/adolescenza
Sangue materno	Ragade anale	Ragade anale	Ragadi, emorroidi
Coagulopatia	Colite allergica	Colite infettiva	MICI
Sepsi	Polipo giovanile	Polipo giovanile	Colite allergica
NEC	Colite infettiva	Invaginazione	Colite infettiva
Colite allergica	Iperplasia linfoide	Colite allergica	Diverticolo Meckel
Hirschsprung	Diverticolo di Meckel	Iperplasia Linfoide	Vasculite
Volvolo	Vasculite	Vasculite	Polipo/poliposi
Duplicazione intestinale	Angiodisplasia	Angiodisplasia	Angiodisplasia
angiodisplasia	Duplicazione intestinale	Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali	Invaginazione

# sintomi

## RCU

- Rettorragia 95%
- Diarrea 95%
- Dolore addominale 75%
- Calo ponderale 50%
- Febbre 30%
- Ritardo di crescita 10%
- Extra-intestinale 5%

## CROHN

- Dolore addominale 85%
- Diarrea 80%
- Calo ponderale 80%
- Ritardo di crescita 25-85%
- Febbre 35-70%
- Anoressia 30-70%
- Rettorragia 35%
- Malattia perianale 25%
- Extra-intestinale 25%
- Nausea e vomito 20%

# Dolore addominale nel bambino

## **Functional**

- Irritable bowel syndrome
- Functional abdominal pain

## **Gastrointestinal**

- esophagitis
- gastritis
- duodenitis
- peptic ulcer
- eosinophilic gastroenteritis
- malrotation
- cysts (duplication c)
- celiac disease
- parasites
- hernias
- tumors
- foreign body
- intussusception
- inflammatory bowel disease

## **Metabolic**

- porphyria
- diabetes
- lead poisoning

## **Hematological**

- angioedema
- collagen vascular disease
- sickle cell disease

## **Musculoskeletal**

- trauma
- inflammation
- infection
- tumor

## **Psychiatric**

- conversion reaction

## **Respiratory**

- infection, tumor or inflammation

## **Diaphragm**

## **Hepatobiliary**

- cholelithiasis


- nephrolithiasis

unction

is

# Segni e sintomi d'allarme nel bambino

- Dolore persistente nei quadranti di destra
- Disfagia
- Vomito persistente
- Sanguinamento GI
- Malattia perianale
- Diarrea notturna
- Perdita peso involontaria
- Dolore che risveglia bambino
- Storia familiare di MICI, celiachia o ulcera
- Artrite
- Crescita lineare ↓
- Ritardo puberale
- Febbre inspiegata



# Esami di laboratorio

- Emocromo
- Marker infiammatori: VES, proteina C-reattiva
- Indagini nutrizionali: Albumina, PT, Fe, Ca, ALP, funz. epatica e pancreatica,
- ASCA, pANCA,

La negatività delle indagini di laboratorio tuttavia non esclude in maniera assoluta la presenza di una MICI; in questi casi è solo il sospetto clinico che induce a proseguire nella diagnostica strumentale

# Esami di laboratorio

## Esami su feci:

- Indagini microbiologiche:
  - coprocoltura (*shigella, salmonella, yersinia, campylobacter, clostridium, ameba*),
  - ricerca parassiti feci,
  - ricerca tossina *Clostridium Difficile*
- Ricerca Sangue occulto
- Calprotectina fecale

Screening per TBC

# Esami strumentali

## Ecografia:

- valutazione Ileo terminale, colon prossimale  
(spessore, peristalsi, stratificazione)
- Area peri-ileale (ascessi, fistole, linfonodi, ecc)



# Esami di II livello


## Endoscopia

Definizione diagnostica e Valutazione topografica

- colonscopia + ileoscopia
- EGDS (Crohn)
- Biopsie multiple

# CLINICAL PRESENTATION OF CD IN CHILDREN AND ADULTS

Mamula P. et al. *Gastroenterol Clin North Am* 2003;32: 967-995



# Presentazione clinica RCU

- colon 100%
- retto indenne 20%
- tratto GI alto 25%

# Storia naturale delle IBD pediatriche e conseguenze di uno scarso controllo della malattia in bambini e adolescenti

## Complicanze fisiche

- Alterazioni stato di salute e di nutrizione
- Ritardo di crescita
- Ritardo puberale

Effetti collaterali dei trattamenti farmacologici

Manifestazioni Extra-intestinali

Rischio di chirurgia (~30 % a 3 anni)

Complicanze psicosociali

# Riduzione della velocità di crescita

46% dei pazienti prima dell'insorgenza dei sintomi;

42% dopo l'insorgenza dei sintomi

Dal 20% al 30% dei bambini che soffrono di IBD diventeranno adulti con bassa statura (o ridotta rispetto al potenziale genetico)

# GROWTH FAILURE IN CROHN'S DISEASE

Increased  
needs  
Malabsorption




**MALNUTRITION**




Suboptimal  
intake  
Increased  
GI losses



**GROWTH FAILURE**



**Corticosteroids**



**INFLAMMATORY CYTOKINES**

# Obiettivi del trattamento

Indurre la remissione

Mantenere la remissione

Guarigione mucosale

Prevenire le complicanze (fistole, stenosi...)

Migliorare la qualità di vita

Limitare l'uso di corticosteroidi

Evitare ospedalizzazioni e ridurre il rischio di  
chirurgia

Ripristinare e mantenere uno stato nutrizionale  
adeguato

# Terapia nutrizionale (Crohn)

Induzione di remissione

- malattia ileale o ileo-colica

Correzione malnutrizione e deficit di accrescimento

Meccanismo d'azione (?)

- riposo intestinale
- migliore stato nutrizionale
- down-regulation citochine
- modificazione flora intestinale